

**ROSA KORSCHINSKIANA** sp. n. (1) (Fig. 3)

Aiguillons droits ou légèrement courbés, parfois dirigés en haut, la plupart géminés ou ternés, fortement et graduellement dilatés à la base, aussi longs ou un peu plus longs que les plus grandes folioles, jaunes, entremêlés sur les rameaux d'acicules plus ou moins nombreux.

Feuilles très petites, 15 à 38 mm. de longueur; folioles 5 ou 7, serrées, sessiles ou pétiolulées, suborbiculaires, ovales ou ob-ovales, arrondies ou tronquées à l'extrémité, 5 à 13 mm. de longueur, pubescentes et glanduleuses sur les deux faces, les glandes tantôt faibles, tantôt très fortes et très nombreuses; dents pour la plupart un peu composées-glanduleuses (2 à 5 glandes), 5 à 11 de chaque côté; pétioles pubescents et glanduleux, avec ou sans quelques acicules; stipules adnées, assez larges, à oreillettes triangulaires ou acuminées, glanduleuses en dessous et sur les bords.

Fleurs solitaires ou ternées, non ou à peine dépassées par les feuilles insérées à leur base; pédicelle 2 à 8 mm. de longueur, à soies glanduleuses, ainsi que l'urcéole globuleux; sépales 8 à 11 mm. de longueur, plus courts que les pétales, qu'ils ne dépassent pas dans le bouton, non pincés à la base, pointus ou un peu élargis à l'extrémité, sans appendices latéraux, à dos hérissé de soies glanduleuses; corolle 30 à 40 mm. de diamètre; disque réduit à un simple bourrelet; styles velus-laineux, les stigmates formant un capitule aplati ou très bombé; 60 à 70 étamines, Bractées bien développées, glanduleuses sur les bords.

Les spécimens pour lesquels je propose cette espèce nouvelle sont conservés dans l'herbier Crépin, sous le nom de *R. Web-biana*, et avaient été reçus de l'herbier de l'Académie de St-Pé-tersbourg.

Je prends pour type de l'espèce un grand rameau florifère, accompagné de deux ramuscules florifères, provenant de la chaîne de l'Alaï près de Daraut-Kurgan, au Nord-Est de l'Etat de Bouk-hara, vers l'altitude de 2,500 m., faisant partie des récoltes de S. Korschinsky, juillet 1895 (n° 27-29). Un autre grand rameau

(1) *R. glutinosa* affinis; heteracantha; foliola parva (5-13 mm. longa), supra glandulosa, dentibus utrinque 5-11; pedicelli breves (2-8 mm. longi); sepala integra (8-11 mm. longa); diametrus corollae 30-40 mm.

florifère a été recueilli par le même botaniste dans l'Etat de Boukhara à Darmaz, en juin 1897 (n° 1342). Une troisième localité est représentée par un spécimen mal conservé, du mont Tchingan, rive gauche du Tchirtchik à l'Est de Tachkent, Turkestan, 2,000 m. environ, leg. A. Regel, 1881, lequel, par ses folioles fortement glanduleuses sur les deux faces, me semble appartenir à la même espèce, qui, par ce caractère, s'écarte de toutes les formes microphylls réunies par Crépin sous le nom de *R. Webbiana*, var.



Fig. 3. — *Rosa Korschinskiana*.

Rameau florifère et bouton détaché. Type de l'espèce, grandeur naturelle.

Ce caractère, joint à l'hétéracanthie, à la brièveté du pédicelle et à la très large ouverture du disque, fait songer au *R. glutinosa*, qui pourrait bien, par très rare exception, se présenter avec les sépales privés d'appendices latéraux, ainsi que cela a été constaté chez l'espèce voisine *R. sicula*. Mais la provenance des spécimens ici décrits est en dehors de l'aire connue du *R. glutinosa*.

*nosa*, dont aucun des très nombreux échantillons que je décris plus loin ne montre moins de 12 dents de chaque côté aux plus grandes folioles, ni les gros aiguillons aussi régulièrement géminés et aussi graduellement élargis à la base, et chez lequel les sépales sont rarement aussi courts.

Cette espèce établit en quelque sorte le passage du *R. Webbiana* au *R. glutinosa*.